



Инде декабрь – ноябрь айларынын берниче атнасы рәттән Торбеево районында яшәвчеләрнен кош-кортнын күпләп үлүе борчу уята. Күпчелек торак пунктлардагы ярдәмче хужа-лыкларда тавыклар саны кискен кимеде. Кошлар нәлак булуга нәрсә сәбәп булды һәм бу авыруны ничек туктатырга дигән сорауга Торбеево ветстанциясе баш табибы Юрий Киселев җавап кайтарган:- Без квартал саен мониторинг тикшеренүләре үткәрәбез. Бүгән күп кенә хужалыкларда тавыклар бактерия характерындагы «аринготрахеит» дип аталган авырудан үлә. Бу тавык отрядындагы кошларнын кискен йогышлы сулыш авыруы, трахеянын катараль-геморрагик ялкынсынуы, борын куышлыгы, авыр сулыш һәм йоткерү белән характерлана. Бу авыру сезонлылар рәтенә керә; ул һава торышынын үзгәрүе белән бәйле. Яшь тавык һәм чебиләрдә авыру кошны ин начар шартлар булган башка бүлмәләргә күчәргәннән сон (дымлылык арту, вентиляция житмәв, начар туклану һ.б.) барлыкка килә. Авыру таралу факторлары булып терлек азыгы, су, аяк киеме һәм авыру кош-корт, пычранган киём хезмәт итә. Инфекция аэрогеник рәвештә була. Йоткәргәндә авыру тавык вирус булган кечкенә тамчыларны һавага чыгарып җибәрә. Кыргый кош, тычканнар авырунын механик векторлары булырга мөмкин. Гадәттә салкыннар килү белән тавыкларнын үлеме күзәтелә. Климат шартларынын кискен үзгәрүе кош-корт-ларда иммунитетнын зәгыйфьләнгәнә китерә, шунын белән торле бактерия инфекцияләре барлыкка килә, еш кына алар зәгыйфь урынга - үпкәләргә һәм бронхларга тәэсир итә. Әлбәттә, зур үлемнән сакланырга мөмкин. Ветеринария кагыйдәләре буенча, тавыклар билгеле бер температурада булырга тиеш. Сквозняклар булмавы, салам белән капланган чиста идән кош-кортка инфекция эләкмәскә булышчак. Әгәр бер-ике тавыкнын авырып киткән күрсәгез, аларны сәламәтләреннән аерырга, ә калган малга антибиотик терапия үткәргә кирәк.

Баш ветеринария табибы фикеренчә, әлегә тавык авыруы кешеләр очен куркыныч тудырмый. Әгәр дә сез кош авыру икәнән күрсәгез, антибиотик терапия үтү очен, билгеләнгән ветстанциягә морәҗәгать итәргә кирәк. Бинада дезинфекция ясарга кирәк.

Раиса АГИШЕВА